

# STANDARD PROVVISORIO DEL CANARINO JASPE DOPPIO FATTORE

Negli ultimi anni la selezione mirata operata dagli allevatori della mutazione Jaspe ha portato alla produzione di soggetti omozigoti, comunemente denominati "Jaspe Doppio Fattore" o "Jaspe Doppia Diluizione" con caratteristiche fenotipiche che rispondono al requisito della differenziazione, fondamentale affinché un nuovo tipo possa essere ufficialmente riconosciuto e ammesso a concorso.

Diverse fonti riportano che il fattore Jaspe opererebbe una riduzione del 50% della carica melaninica rispetto al singolo fattore.

È evidente che una tale affermazione avrebbe bisogno di un riscontro scientifico (osservazione al microscopio della concentrazione dei granuli di melanina su rachide, barbe e barbule) che ad oggi non ci risulta effettuato.

Tuttavia tale assunto può costituire un punto di riferimento importante per valutare l'espressione ottimale della carica melaninica manifestata.

## NERO JASPE DOPPIO FATTORE

### *Caratteri tipici*

- Il canarino evidenzia una tonalità melaninica grigiastra, molto diluita.
- Il disegno seppur leggero dovrà essere chiaramente percettibile, completo su testa dorso e fianchi e con la conformazione tipica del Singolo Fattore.
- La barratura alare e caudale dovrà essere visibile e con estensione pari al Singolo Fattore.
- Ossidazione delle parti cornee.
- **L'evidenziazione del rachide melanizzato (ad oggi non sempre manifestato) costituisce un pregio e un indicazione per il miglioramento selettivo della mutazione.**

### Difetti:

- Presenza di melanina bruna visibile.
- Tonalità melaninica poco percettibile o, al contrario tendente a quella del singolo fattore.
- Scarsa ossidazione delle parti cornee.
- Barratura poco evidente o eccessivamente estesa
- Presenza di penne non interessate dalla mutazione

## Punti a disposizione 30

### *Parametri di valutazione*

Valutazione	Descrizione	Punti
<b>OTTIMO</b>	<p>Il piumaggio è caratterizzato da un velo di eumelanina grigiastra che lo avvolge lasciando intravedere il disegno tipico della mutazione.</p> <p>Melanizzazione del rachide percettibile, bordatura delle penne del dorso di colore grigio chiaro che delimita un'area più chiara che forma un disegno lineare chiaramente percettibile.</p> <p>Il disegno deve essere percettibile su testa e fianchi.</p> <p>La barratura delle remiganti e delle timoniere deve avere la stessa estensione</p>	<b>29</b>

	<p>del singolo fattore. Assenza di melanina bruna visibile. Becco zampe ed unghie ossidati.</p>	
<b>BUONO</b>	<p>Rispetto all'ottimo, la valutazione "buono" va attribuita al soggetto che si discosta leggermente dalle caratteristiche tipiche, con una leggerissima presenza di melanina bruna, un disegno meno netto e/o leggermente discontinuo. Il disegno su testa e fianchi deve essere visibile. Barratura alare e caudale con estensione leggermente maggiore o minore rispetto all'ottimo.</p>	<b>28 – 27</b>
<b>SUFFICIENTE</b>	<p>Espressione melaninica sufficiente a individuare il tipo. Tonalità eumelaninica chiaramente inferiore (slavato) o superiore rispetto a quella tipica o che evidenzia melanina bruna. Disegno eumelaninico corto e stretto, ovvero non visibile con una patina di melanina che avvolge il piumaggio senza evidenziare il disegno. Barratura alare e caudale poco estesa o troppo estesa. Becco, zampe ed unghie scarsamente melanizzati.</p>	<b>26 – 24</b>
<b>INSUFFICIENTE</b>	<p>Sarà valutato insufficiente il soggetto la cui tonalità tende al singolo fattore o che comunque non evidenzia le caratteristiche tipiche previsto dallo standard. Sarà altresì valutato insufficiente il canarino che mostra più difetti tra quelli di seguito elencati anche tenendo conto della gravità di ognuno di essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno eumelaninico stretto e discontinuo</li> <li>- Mancanza di disegno su testa e fianchi.</li> <li>- Eccesso di melanina bruna.</li> <li>- Piume melaniche che non manifestano la mutazione.</li> <li>- Barratura alare e caudale assente o che si estende alle remiganti secondarie e terziarie o troppo estese sulla coda.</li> </ul> <p>Becco, zampe e unghie chiari.</p>	<b>23 – 18</b>

## BRUNO JASPE DOPPIO FATTORE

### Caratteri tipici

- Il canarino evidenzia un velo di eumelanina bruna , molto diluita.
- Il disegno seppur leggero dovrà essere chiaramente percettibile, completo su testa dorso e fianchi e con la conformazione tipica del Singolo Fattore.
- La barratura alare e caudale dovrà essere visibile e con estensione pari al Singolo Fattore.
- Parti cornee brunastre.
- L'evidenziazione del rachide melanizzato costituisce un pregio e un indicazione per il miglioramento selettivo della mutazione.

### Difetti:

- Presenza di feomelanina bruna rossiccia visibile.
- Melanizzazione non chiaramente percettibile (attualmente rappresenta il difetto più diffuso)
- Scarsa ossidazione di becco, zampe e unghie.
- Barratura poco evidente o eccessivamente estesa
- Presenza di penne non interessate dalla mutazione

**Punti a disposizione 30**

### Parametri di valutazione

Valutazione	Descrizione	Punti
<b>OTTIMO</b>	Il soggetto tipico evidenzia un velo di eumelanina bruna diffusa su tutto il piumaggio che lascia intravedere un leggero disegno, nella tipica conformazione della mutazione, lineare e completo su dorso testa e fianchi Fianchi e testa striature appaiono nette e il piu' lungo e largo possibile. La barratura alare e caudale è ben definita ma non troppo estesa. Becco, zampe ed unghie brunastre.	<b>29</b>
<b>BUONO</b>	Rispetto all'ottimo, la valutazione "buono" va attribuita al soggetto che si discosta leggermente dalle caratteristiche tipiche con una espressione melaninica leggermente inferiore ma pur sempre facilmente percettibile e/o con disegno meno netto e/o leggermente discontinuo. Il disegno su testa e fianchi deve essere visibile. Barratura alare e caudale con estensione leggermente maggiore o minore rispetto all'ottimo ma comunque chiaramente percettibile. Fianchi con disegno ben visibile. Becco, zampe ed unghie brunastre.	<b>28 – 27</b>
<b>SUFFICIENTE</b>	Scarsa presenza di eumelanina bruna ma ancora sufficiente a riconoscere il tipo. Striature eumelaniniche corte e strette. Fianchi con striature deboli. Barratura alare e caudale poco estesa o troppo estesa. Penne melaniche che non manifestano la mutazione. Becco, zampe ed unghie chiari.	<b>26 – 24</b>
<b>INSUFFICIENTE</b>	Scarsa melanizzazione del fondo tale da creare difficoltà nel riconoscimento del tipo. Tonalità bruno-rossiccia dell'espressione melanica. Sarà altresì valutato insufficiente il canarino che mostra più difetti tra quelli di seguito elencati anche tenendo conto della gravità di ognuno di essi: - Disegno stretto e discontinuo - disegno scarso su testa e fianchi. - Piume melaniche che non manifestano la mutazione. - Barratura alare e caudale assente o che si estende alle remiganti secondarie e terziarie o troppo estese sulla coda. Becco, zampe e unghie chiari. Penne che non manifestano totalmente la mutazione.	<b>23 – 18</b>

### AGATA JASPE DOPPIO FATTORE

L'effetto del Doppio Fattore nell'Agata, se tipico, genera un canarino molto particolare e interessante soprattutto mosaici e negli pigmentati.

Caratteri tipici sono:

- Tonalità grigio perla che evidenzia particolare luminosità e brillantezza (queste ultime caratteristiche sono meno evidenti negli intensi e nei brinati).
- Disegno netto, ben visibile e pari a quello dell'agata classico.
- Barratura alare e caudale visibile e con estensione pari al Singolo Fattore
- Becco, zampe e unghie carnucini.

Difetti:

- Scarsa espressione eumelaninica
- Disegno lungo
- Presenza di melanina bruna
- Melanizzazione di becco e unghie
- Penne melaniniche che non evidenziano la mutazione
- Barratura alare poco evidente o eccessivamente estesa
- Tendenza al tipo Agata Opale

## Punti a disposizione 30

### Parametri di valutazione

Valutazione	Descrizione	Punti
<b>OTTIMO</b>	Tonalità melaninica complessiva grigio perla molto luminosa con disegno ben evidente di conformazione pari a quello dell'agata classico. Disegno netto e ben visibile su testa e fianchi. Assenza di melanina bruna visibile. Barratura alare e caudale ben definita con la tipica estensione del singolo fattore. Becco e unghie chiari.	<b>29</b>
<b>BUONO</b>	Sarà valutato "buono" il soggetto che si discosta leggermente dall'ottimo per la tonalità del disegno o per la sua estensione, ovvero per la presenza di melanina bruna appena percettibile, ovvero per un'estensione delle barrature appena maggiore o inferiore all'ottimo. Becco e unghie chiari.	<b>28 – 27</b>
<b>SUFFICIENTE</b>	Scarsa espressione melaninica ma ancora sufficiente a individuare il tipo. Striature eumelaniniche lunghe e larghe o poco evidenti sulla testa e sui fianchi. Presenza di melanina bruna. Barratura alare e caudale poco marcata o troppo estesa. Leggera melanizzazione su becco e/o unghie.	<b>26 – 24</b>
<b>INSUFFICIENTE</b>	Tonalità melaninica scarsa e appena percettibile. Tendenza al tipo Agata Opale. Striature eumelaniniche troppo larghe e troppo lunghe o assenti sulla testa e sui fianchi. Eccesso di melanina bruna. Evidente melanizzazione di becco e unghie. Sarà altresì valutato insufficiente il canarino che mostra più difetti tra quelli di seguito elencati anche tenendo conto della gravità di ognuno di essi: - Striature eumelaniniche lunghe e larghe, - disegno scarso o assenti sulla testa e sui fianchi. - Piume melaniche che non manifestano la mutazione. - Barratura alare e caudale assente o che si estende alle remiganti secondarie e terziarie o troppo estese sulla coda.	<b>23 – 18</b>

### Indicazioni di supporto al giudizio

Per quanto la barratura alare e caudale vale quanto chiarito per il singolo fattore.

La barratura alare dovrà riguardare le remiganti secondarie nella parte centrale. Con l'ala chiusa la barratura non dovrà essere visibile sulle remiganti secondarie e terziarie. Nella coda la barratura deve interessare la parte superiore.

L'assenza o l'eccessiva estensione è un difetto grave e deve essere adeguatamente penalizzato. Tuttavia una barratura appena percettibile potrà determinare la valutazione "sufficiente" nella voce Tipo in un soggetto che risulterebbe ottimo in presenza di estensione tipica.

La presenza di penne melanizzate sarà sempre oggetto di penalizzazione e valutata in ragione della rilevanza del difetto, fino a determinare l'insufficienza quando risulta particolarmente visibile e localizzato su più zone del piumaggio.

### **ISABELLA JASPE DOPPIO FATTORE**

In conseguenza dell'estremo grado di diluizione che la mutazione esercita sull'Isabella, è intuibile che ad oggi non possa essere presa in considerazione la possibilità di riconoscimento di un apposito standard.